

RECICORT® VET DERMANOLON® VET



Dechra förser dig med behandlingsalternativ vid extern otit och seborroisk dermatit i hörselgången eller övriga huden hos hund och katt, även vid fall då antimikrobiell behandling inte är nödvändig. Att använda en steroid till fall som inte behöver antimikrobiella medel hjälper till att minska risken för antimikrobiell resistensutveckling, vilket tryggar framtiden för oss alla. Recicort vet. och Dermanolon vet. innehåller triamcinolonacetonid (steroid) och salicylsyra, och båda läkemedlen kan användas till både hund och katt.



Innehåll	Behandlingseffekt	Läkemedel
Aktiv substans: Triamcinolonacetonid, 1,77 mg/ml	En måttligt potent steroid med antiinflammatorisk och vasokonstriktiv verkan. Hämmar det inflammatoriska svaret och symtomen vid en rad olika tillstånd som ofta associeras med klåda.	Recicort vet., Dermanolon vet.
Aktiv substans: Salicylsyra, 17,7 mg/ml	Keratolytisk effekt.	Recicort vet., Dermanolon vet.
	Ceruminolytisk effekt.	Recicort vet.
	Tar bort överflödiga hudceller när det appliceras kutant, vilket är en viktig del av behandlingen för seborroiska patienter ¹ .	Dermanolon vet.
	Dess sammandragande verkan ger en uttorkande effekt, vilket motverkar maceration ² .	Recicort vet., Dermanolon vet.
pH: Cirka 2,7	Skapar en ogynnsam miljö för mikroorganismer som <i>Malassezia spp.</i>	Recicort vet., Dermanolon vet.
	Leder till en sänkning av hudens pH-värde; seborroisk dermatit förknippas med ett högre pH-värde i huden jämfört med friska hundar ³ .	Dermanolon vet.
Hjälpämne: Etanol, 96 %*	Bakteriocida egenskaper.	Recicort vet., Dermanolon vet.
	Ett flyktigt ämne.	Recicort vet., Dermanolon vet.
	Motverkar uppbyggnaden av biofilm på huden.	Recicort vet., Dermanolon vet.

* Läkemedel som innehåller mer än 50% etanol kan orsaka irritation efter topikal administration.⁴
Det är viktigt att påtala detta för djurägaren, speciellt om det finns synliga lesioner.

TIME TO CHANGE



RECICORT® VET

- Behandling av extern otit och symtomatisk behandling av seborroisk dermatit i örat.
- Kommer i en praktisk 20 ml flaska.
- Särskilt användbar för att behandla vissa typer av extern otit som inte orsakas av bakterie- eller jästsvampsinfektion, som flare ups vid kronisk allergi.
- Innehåller ingen antibiotika, och bidrar därför inte till antimikrobiell resistensutveckling.

DERMANOLON® VET

- Symtomatisk behandling av seborroisk dermatit.
- Kommer i en praktisk 75 ml sprayflaska, som underlättar compliance vid:
 - Ställen som är svåra att nå.
 - Patienter som motsätter sig schamponering.
 - Behandling av mycket begränsade lesioner, t.ex. tassar.
- Innehåller ingen antibiotika, och bidrar därför inte till antimikrobiell resistensutveckling.

Dermanolon vet. kutan spray, lösning för hund och katt. **Aktiva substanser:** Triamcinolonacetonid 1,77 mg, salicylsyra 17,7 mg. **ATCvet-kod:** QD07XB02. **Djurslag:** Hund och katt. **Indikationer:** Symtomatisk behandling av seborroisk dermatit. **Kontraindikationer:** Använd inte vid överkänslighet mot kortikosteroider, salicylsyra eller mot några hjälpämnen. Använd inte på kutana sår. Använd inte till hundar med demodikos. Administrera inte till djur som väger mindre än 3,5 kg. **Särskilda varningar:** I början av behandlingen ska befintliga flagor och/eller exfoliativ debris tas bort. Pals runt lesionerna eller som täcker lesionerna kan behöva klippas, för att läkemedlet ska nå den drabbade huden. Seborroisk dermatit kan vara en primär sjukdom, men kan också uppstå som en följd av underliggande sjukdomar eller sjukdomsprocesser (t.ex. allergiska sjukdomar, endokrina sjukdomar, neoplas). Dessutom kan infektioner (bakterier, parasiter, svampar) ofta uppstå samtidigt med seborroisk dermatit. Därför är det viktigt att identifiera eventuell underliggande sjukdomsprocess och om nödvändigt sätta in specifik behandling. **Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:** Eftersom den minsta kroppsvikten för behandling är 3,5 kg är läkemedlet inte lämpligt för användning till vissa patienter, som mindre hundar och katter eller djur med omfattande lesioner. Systemiska kortikosteroid effekter är möjliga, speciellt om läkemedlet används under ett täckförband, på omfattande hudlesions, vid ökat blodflöde, eller om djuret slickar i sig läkemedlet. Förhindra att behandlade djur samt att andra djur som har kontakt med behandlade djur får i sig läkemedlet (inklusive slickning). Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt den ansvariga veterinärens nytta-/riskbedömning. Använd med försiktighet till djur med misstänkta eller bekräftade endokrina sjukdomar. Eftersom det är känt att glukokortikosteroider minskar tillväxten ska användning till unga djur (under 7 månader) baseras på en nytta-/riskbedömning gjord av den behandlande veterinären och regelbundna kliniska bedömningar ska utföras. Får inte användas i ögon eller på slemhinna. Läkemedlet får inte användas på skadad hud. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Detta läkemedel innehåller triamcinolonacetonid, salicylsyra och etanol och kan vara skadligt för barn vid oavsiktligt intag. Lämna inte läkemedlet utan uppsikt. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Detta läkemedel kan vara skadligt för ett oött barn. Eftersom läkemedlet kan absorberas genom huden ska gravida och fertila kvinnor inte hantera läkemedlet eller hålla fast djuret under behandling, och de ska undvika kontakt med det behandlade djuret i minst 4 timmar efter användning. Detta läkemedel kan vara irriterande för huden eller framkalla överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga för kortikosteroider och salicylsyra ska undvika kontakt med läkemedlet. Undvik hudkontakt med läkemedlet. Använd engångshandskar vid hantering av läkemedlet inklusive när det masseras in i det drabbade djurets hud och när djuret hålls fast under behandling. Vid hudkontakt, tvätta händerna eller exponera hud och uppsök läkare vid överkänslighetsreaktioner eller om irritation kvarstår. Detta läkemedel kan vara irriterande för ögonen. Undvik kontakt med ögonen inklusive hand-till-ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, skölj med rent vatten. Om ögonirritation kvarstår, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten. Detta läkemedel kan vara skadligt vid inhalation, särskilt för personer med astma. Spraya i ett välventilerat utrymme. Andas inte in sprayångorna. Behandlade djur ska inte beröras och barn ska inte tillåtas att leka med behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Nyligen behandlade djur bör inte tillåtas sova med ägarna, särskilt inte med barn. **Biverkningar:** Det är känt att långvarig och omfattande användning av lokala kortikosteroider utlöser lokala och systemiska effekter, inklusive hämning av binjurfunktion, förtunning av epidermis och fördröjd läkning. **Användning under dräktighet eller laktation:** Detta veterinärmedicinska läkemedel ska inte användas under dräktighet och laktation på grund av eventuell absorption av triamcinolonacetonid, särskilt om stora områden på huden måste behandlas. **Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:** Uppgift saknas. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär. **Dos och administreringssätt:** Kutan användning. Behandlingsdosen är 1 pumpning per 1,75 kg kroppsvikt, och den ska ges två gånger/dag. Eftersom det ska appliceras två gånger dagligen ska djuren väga minst 3,5 kg för att tillåta 1 pumpning två gånger/dag. Kontrollera att öppningen på spraypumpen pekar mot det område som ska behandlas. Borsta djurets päl mot pälsknutningen och spraya därefter genom att hålla pumpen cirka 10 cm från behandlingsområdet. Försiktighet ska iaktas för att inte spraya nära djurets ansikte. Vid behov kan området masseras försiktigt, för att säkerställa att läkemedlet når all drabbad hud. Låt torka. Vid svåra fall hos hund kan effekten ökas genom att applicera ett andra och tredje lager omedelbart efter det att det första lagret torkat, under förutsättning att det totala antalet pumpningar inte överskrider maximalt antal (1 pumpning per 1,75 kg, som ska administreras två gånger/dag). En pumpning ger cirka 0,2 ml läkemedel över ett cirkulärt område som är cirka 10 cm i diameter. Behandlingen ska pågå utan avbrott fram till några dagar efter det att de kliniska symtomen har försvunnit helt, men inte längre än 14 dagar. **Karenstid(er):** Ej relevant. **Förpackningsinformation:** Kartong innehållande en 75 ml vit behållare av högdensitetspolyeten med spraypump. **Innehavare av godkännande för försäljning:** Le Vet Beheer B.V. **Lokal representant:** Dechra Veterinary Products AB. **Senast översyn av SPC:** 2022-03-21. **Texten ovan är ett förkortat sammandrag av produktresumén. För ytterligare information, vänligen se www.fass.se eller www.dechra.se.**

Recicort vet örondroppar, lösning. **ATCvet-kod:** QD07XB02. **Aktiva substanser:** Triamcinolonacetonid 1,77 mg, Salicylsyra 17,7 mg. **Djurslag:** Hund och katt. **Indikationer:** Extern otit. Symtomatisk behandling av seborroisk dermatit i örat. **Kontraindikationer:** Använd inte vid överkänslighet mot kortikosteroider, salicylsyra eller mot några hjälpämnen. Använd inte till djur med perforerad trumhinna eftersom läkemedlet kan vara ototoxiskt. Använd inte till hundar med demodikos. **Särskilda varningar för respektive djurslag:** För en effektiv behandling av extern otit är det viktigt att hörselgången är noggrant rengjord och torr före första behandlingen för att ta bort örönax och/eller exsudat. Kraftig härväxt runt behandlingsområdet bör vid behov klippas. För en effektiv behandling av seborroisk keratos ska befintliga flagor och/eller exfoliativ debris tas bort. Här runt lesionerna eller som täcker lesionerna kan behöva klippas för att läkemedlet ska nå den drabbade huden. Extern otit och seborroisk dermatit kan vara primära sjukdomar, men kan också uppstå som en följd av underliggande sjukdomar eller sjukdomsprocesser. Dessutom kan infektioner ofta uppstå samtidigt med seborroisk dermatit eller komplicera fall av extern otit. Därför är det viktigt att identifiera eventuell underliggande sjukdomsprocess och om nödvändigt sätta in specifik behandling. **Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:** Maximal dos som kan administreras är 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Den rekommenderade behandlingsdosen ska inte överskrida 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Försiktighet ska iaktas för att inte överskrida denna mängd, särskilt vid behandling av mindre djur eller när båda örönen behöver behandlas. Vid extern otit med en infektionskomponent ska vid behov specifik behandling administreras. Systemiska kortikosteroid effekter är möjliga, speciellt om djuret slickar i sig läkemedlet. Förhindra att behandlade djur får i sig läkemedlet eller att andra djur har kontakt med behandlade djur. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär. Använd med försiktighet till djur med misstänkta eller bekräftade endokrina sjukdomar. Eftersom det är känt att glukokortikosteroider minskar tillväxt ska användning till unga djur baseras på en nytta-/riskbedömning av behandlande veterinär och regelbundna kliniska bedömningar ska utföras. Försiktighet ska iaktas för att undvika kontakt med ögon. Läkemedlet får inte användas på skadad hud. Vid överkänslighet mot någon av komponenterna ska örat tvättas noggrant. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Detta läkemedel innehåller triamcinolonacetonid, salicylsyra och etanol och kan vara skadligt för barn vid oavsiktligt intag. Lämna inte läkemedlet utan uppsikt. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Detta läkemedel kan vara irriterande för huden eller framkalla överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga för kortikosteroider och salicylsyra ska undvika kontakt med läkemedlet. Undvik hudkontakt med läkemedlet. Använd engångshandskar vid hantering av läkemedlet inklusive när det masseras in i det drabbade djurets hud. Vid kontakt, tvätta händerna eller exponera hud och uppsök läkare vid överkänslighetsreaktioner eller om irritation kvarstår. Detta läkemedel kan vara irriterande för ögonen. Vid kontakt, skölj med rent vatten. Om ögonirritation kvarstår, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten. Detta läkemedel kan vara skadligt för foster. Eftersom läkemedlet kan absorberas genom huden ska gravida och fertila kvinnor inte hantera läkemedlet eller hålla fast djuret under behandling, och de ska undvika kontakt med örat på det behandlade djuret i minst 4 timmar efter användning. Behandlade djur ska inte beröras och barn ska inte tillåtas att leka med behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Nyligen behandlade djur bör inte tillåtas sova med ägarna, särskilt inte med barn. **Biverkningar:** Det är känt att långvarig och omfattande användning av lokala kortikosteroider utlöser lokala och systemiska effekter, inklusive hämning av binjurfunktion, förtunning av epidermis och fördröjd läkning. I sällsynta fall har rapporterats rodnad och hudskalning. **Användning under dräktighet eller laktation:** Säkerhet av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd bara enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär. **Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:** Uppgift saknas. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär. **Dos och administreringssätt:** För användning i örat. Hörselgång: Rengör hörselgången och ytterörat. Den rekommenderade behandlingsdosen är 8-10 droppar som administreras i den drabbade hörselgången/hörselgångarna en eller två gånger dagligen. Massera örat och hörselgången noggrant och försiktigt för att säkerställa korrekt distribution av läkemedlet. Behandlingsdosen ska inte överskrida 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Försiktighet ska iaktas för att inte överskrida denna mängd, särskilt vid behandling av mindre djur eller när båda örönen behöver behandlas. Behandling ska fortsätta utan avbrott några dagar efter att de kliniska symtomen försvunnit helt, men inte längre än 14 dagar. Om den externa otiten inte förbättras efter 3 dagars behandling ska behandlingen bedömas på nytt. Ytteröra: Vid behandling av seborroisk dermatit i ytterörat ska tillräckligt antal droppar per dag appliceras på örats yta, så att dessa täcker hela det drabbade området när de sprider sig. Vid behov kan området masseras försiktigt för att säkerställa att läkemedlet når all drabbad hud. Låt torka. Vid svåra fall kan effekten ökas genom att applicera ett andra och tredje lager omedelbart efter att det första lagret torkat, under förutsättning att det totala antalet droppar inte överskrider den maximala dosen 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Försiktighet ska iaktas för att inte överskrida denna dos vid behandling av mindre hundar och katter. Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att de kliniska symtomen har försvunnit helt, men inte längre än 14 dagar. Långvarig användning av höga doser av triamcinolon kan framkalla binjurbarksvikt. **Förpackningsinformation:** 1 flaska 20 ml. **Innehavare av godkännande för försäljning:** Le Vet Beheer B.V. **Lokal ombud:** Dechra Veterinary Products AB. **Senast översyn av SPC:** 2019-05-03. **Texten ovan är ett förkortat sammandrag av produktresumén. För ytterligare information, vänligen se www.fass.se eller www.dechra.se.**

Referenser

- 1 http://www.merckvetmanual.com/pethealth/dog_disorders_and_diseases/skin_disorders_of_dogs/seborrhea_in_dogs.html
- 2 Sánchez-Leal, J., Mayó, L., Homedes, J., Ferrer, L. (2006) In vitro investigation of cerumenolytic activity of various otic cleansers for veterinary use. European Society of Veterinary Dermatology. **17**, 121-127
- 3 Matousek, J. L. and Campbell, K. L. (2002), A comparative review of cutaneous pH. Veterinary Dermatology, **13**: 293-300.
- 4 Rowe, R.C., Sheskey, P.J., Quinn, M.E. (2009) Handbook of Pharmaceutical Excipients (6th edition, p. 18) London: Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association

Dechra Veterinary Products AB technical.nordic@dechra.com 08-32 53 55

www.dechra.se

April 2022