


Behandling och uppföljning av hyperadrenokorticism hos hund



* Om post-ACTH-kortisol är >250 nmol/l och de kliniska tecknen på hyperadrenokorticism är markanta, kan en dosökning med minsta möjliga mängd övervägas. Använd kombinationer av kapselstorlekar, för att sakta öka den dagliga dosen.

Behandling och uppföljning av hyperadrenokorticism hos hund




VETORYL®

För ytterligare information eller teknisk support, vänligen ring 08 - 32 53 55

VETORYL®: Kapsel, hård: 10mg, 30 mg, 60 mg och 120 mg. Aktiv substans: Triostan. ATC-kod: QH02CA01. Indikation: För behandling av hypotys- och binjurelaterad hyperadrenokorticism (Cushings syndrom) hos hund. Kontraindikationer: Skall inte användas till djur som lider av primär leversjukdom och/eller njurnsufficiens. 10 mg och 30 mg kapslarna skall ej ges till hundar som väger mindre än 3kg, 60 mg kapslarna skall ej ges till hundar som väger mindre än 10 kg och 120 mg kapslarna skall ej ges till hundar som väger mindre än 20 kg. Datum för översyn av produktresumen: 2014-11-25. Receptbelagt läkemedel. Förpackningsstorlek: 30 kapslar, blister. För mer information se www.fass.se eller www.dechra.se.

Dechra Veterinary Products AB

Telefon: 08- 32 53 55

Augusti 2016

www.dechra.se

E-post: technical.senoff@dechra.com


Dechra
Veterinary Products